

Predatie aan weidevogels




Jeroen Nuijsl
FPG / FBE Utrecht

Vossen eten weidevogels...




Maar bovenal: kleine knaagdieren, konijnen, insecten en andere vogels...

Toename van de predatiedruk?



De predatiedruk neemt jaarlijks toe met ca. 0,5%
(bron: landschapsbeheer Nederland)


Predatie...




Uitkomstpercentage: 52 – 54%

Verlies: predatie (24- 27%)
agr. werkzh. (6-9%)
verlating (5-7%)

Regionale verschillen



Predatie van weidevogelleghsels



Zoogdieren:

Vos, Hermelijn,
Steenmarter, Buzzing,
Egel, Hond en Wezel

Vogels:

Kraai, Bruine Kiekendief,
Havik en Scholekster

Predatie van weidevogelkuikens



Predatie van weidevogelkuikens:

“ Predatie door vogels aanzienlijk groter dan predatie door zoogdieren”

- Reiger (8-18%)
- Hermelijn, Wezel, Bunzing (15%)
- Buizerd (12%)
- Zwarte kraai (6%)

P
R
E
D
A
T
O
R
E
N



Oplossing...



Primair: zorg voor een 'ideaal' weidevogelbiotoop met een gevarieerde vegetatie, een relatief hoge (grond)waterstand en veel sloten

Inzet op meerdere fronten



Conclusie

Oftewel:

Verskillende beperkende factoren dienen gelijktijdig te worden aangepakt: het eindresultaat wordt dan groter dan de som der delen

Noodzaak:

Intensief maatwerk op gebiedsniveau



Discussie...