





Legenda
Vertrouwelijke legenda Bijlage 7







geomorfologische krt erlecom

Schaal 1:15.000 Afdrukdatum: 27 mei 2008 Topografie: © TSK - Nederland



ERLECOMSEWAARD

*ONBEKADE UITERWAARD

*AANKOOP VAN OOSTELIJK DEEL
OEVERWAL MEDIO 1983

*OP DEEL OEVERWAL '91-'92 NOG 3500
NESTEN VAN KOKMEEUW IN VOORAL
GROTE BRANDNETEL

*OEVERWAL TUSSEN 11M EN 14 +NAP

*OVERZANDING VAN DE OEVERWAL

*MET INCIDENTELE SEIZOENS BEGRAZING

*GEEN HOOGWATERVLUCHTPLAATS

ERLECOMSEWAARD

DROGE RUIGTEN EN BOSZOMEN:

*VOORAL OP DE OEVERWAL

*OA: STIJVE STEENRAKET, TORENKRUID, PIJPBLOEM,
LIGGENDE EREPRIJS, WILDE MARJOLEIN,
RIVIERKRUISKRUID, ZANDWOLFSMELK,
BOSKORTSTEEL, STINKENDE BALLOTE,
WEIDEKERVEREL, KNOLRIBZAAD, BORSTELKRANS,
KRUISBLADWALSTRO.

*BEHEER: TOT 2007 SEIZOENSBEWEDING OP +/- 60 HA
MET 40 RUNDEREN (GVE)

*VANAF 2008 MET GALLOWAYS EN KONIKS (40 DIEREN)

ERLECOMSEWAARD

2008 STARTEN MET FREE

TOTAAL 40 DIEREN


WAARVAN:

+/- 30 RUNDEREN

+/- 10 KONIKS

ZO LANG MOGELIJK IN HET JAAR GRAZEN

MET HOOGWATER ERUIT



Millingerwaard

Begrazingsgebied

-  1991
-  1992
-  1993
-  1994
-  1997
-  2000
-  2002
-  2004
-  2005
-  enclave

MILLINGERWAARD

HOGERE DELEN OEVERWAL GEMEENSCHAPPEN

OA: HARDHOUTOOIBOSSEN (IEPENRIJKE EIKEN/ESSENBOS)

STRUWELEN (BOSRANKSTRUWEEL)

GRAZIGE VEGETATIES EN RUIGTES

(GLANSHAVERVERB. EN ASS. VAN SIKKELKLAVER
EN ZACHTE HAVER)

LAGERE DELEN

OA: MOERASBOS

NATTE GRASLANDEN

MOERAS EN WATERVEGETATIES

OPEN WATER



BEGRAZING

MILLINGERWAARD

	<u>KONIKS</u>	<u>GALLOWAYS</u>	<u>TOTAAL</u>
2003	46	85	131
2004	45	53	98
2005	67	67	134
2006	38	42	80
2007	45	52	97
2008	46	45	91
	<u>AFSPRAAK MET FREE:</u>		
2009	46	65	111

SCHOUW

- *JAARLIJKSE SCHOUW EIND MAART
- *DOEL AFSTEMMING GEWAS GROEI MET AANTALLEN DIEREN
- *80 % VAN DE OPP. KOMT KORT DE WINTER UIT, HOGERE DELEN ZIJN KORT
- *VERVILTING KLEINSCHALIG TOEGESTAAN

MILLINGERWAARD

COLENBRANDERSBOS

1813 FAM. COLENBRANDER

1968 EIGENDOM VAN RWS DOORGEPLANT MET CAN. POPULIE

1979 STAATSBOSBEHEER EIGENAAR

5,5 HA GROOT

HARDHOUTOOIBOS TYPE: ABELN-IEPENBOS

ONTWIKKELINGSTIJD 100/300JAAR

BOOMSOORTEN: ZWARTE POPULIER

EIK

ES

FLADDERIEP

ZOETE KERS

STRUIKEN: WILDE KARDINAALSMUTS,

2 STIJLIGE MEIDOORN, VLIER, SLEEDOORN

LIANEN: HOP, BOSRANK



COLENBRANDERSBOS

VANUIT RIJSHOUTCULTUUR
NA OPZANDING, HOGERE STANDPLAATS
1950 DOORGEPLANT MET CANADA POPULIER
IS IN HET VERLEDEN EXTENSIEF BEGRAASD

COLENBRANDERSBOS

- *CANADA POPULIEREN VERWIJDEREN (ZAGEN & RINGEN)
IN EEN PERIODE VAN +/- 15 JAAR
- *NA VESTIGING KRITISCHE SOORTEN ELDERS, HET BOS
WEER OPENSTELLEN VOOR GRAZERS

COLENBRANDERSBOS

KRUIDACHTIGEN:

*OA:

SLANGELOOK, BESANJELIER, MUSKUSKRUID,
RIVIERKRUISEKRUID,
GEVINDE KORTSTEEL, KNOLRIBZAAD,
MAARTSVIOOLTJE.

VERLEDEN: OA. GULDEN SLEUTELBLOEM.

VOOR 1950 EXTENSIEF BEGRAASD GEWEEST

COLENBRANDERSBOS

1995: VEEL ZANDAFZETTING IN EN ROND HET BOS

2000: OPGENGESTELD VOOR GRAZERS

2003: ZEER VEEL TRED EN VRAAT, DOOR: DROGE ZOMER
: HOOG WATER

2003: BESANJELIER VAN +/- 45 NAAR 8

2004: AFGESLOTEN IN GROEISEIZOEN VOOR GRAZERS

2004/2007 'S WINTERS TOEGANKELIJK VOOR GRAZERS

2005: ZWARE DUNNING OP CANADA POPULIER

2008: BESANJELIER OP 9 LOCATIES

2008: WINTER, VOORJAAR EN ZOMER BEGRAASBAAR

WORDT ZEER EXTENSIEF BEZOCHT DOOR GRAZERS

STREVEN TOEVOEGING AAN DE JAARROND BEGRAZING



WAALPROGRAMMA RWS

- MINIMALISEREN VAN BAGGEREN IN DE BOCHTEN
- BEVAARBARE BREEDTE VAN 110 M NAAR 170 M
 - * VERLAGING VAN DE STREKDAM (VAN 1963)
 - * AANBRENGEN VAN ONDERWATERSCHERMEN
 - * KRIBBEN VERLAGING

WANNEER GEEN AANPASSING VAN DE BELIJNING
(KRIBBEN EN SCHERMEN) DAN MOET ER JAARLIJKS
+/- 37.500 M3 GEBAGGERD WORDEN













Uitbreiding begrazingsgebied

